


25%WP

INSECTICIDE



Imidacloprid: .... 250gm/Kg (25%W/W)



## IMIDACLOPRID 25%WP

امیڈ اکٹو پر ڈیٹٹر وکو پیڈ ائن گروپ (Nitroguanidine Group) کا انتہا کی حاقتر رکھنل ساتھ رکھنل سرائیت پند یاور دیر پیا اثر رکنے والاز ہر ہے۔ کہاں کرر ہے ہے وال محلوماً ہم انتہا کی حاقتر رکھنل کا انتہا کی حاقتر رکھنل کے

امیڈاکلو پرؤ کوکٹس مرائیت یہ بے و نے کی وجہ سے کیاس کی فصل پر ہرمر ملے ش نہایت کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

| مقدار فی ایکڑ | نقصان دو کیڑے               | فصل  |
|---------------|-----------------------------|------|
| 250 کام       | سېز تيلا ،سفيد يکھي ،تھر پس | کپای |
| 75 کام        | 4.                          | وحال |
| 75 کام        | 11년11년                      | بيب  |

نوٹ: سفید کھی کےشدید حملے کی صورت میں بےدن بعدد وبار واسیرے کریں۔

طریقہ استعمال: زبر کوئی بھی ہاتھ سے بطنے والی یا مشیقی امپر ئیرے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زبر کی سفارش کر دومقدار کا تھوڑے سے یافی میں انتہا طرح کلول بنالیں۔ امپرے نیک کو یافی ہے آدھا کھرلیں۔ تیار شده کلول کو نیک میں ڈال کریا نی ہے مقررہ صد تک جر لیس اور کھراس طرح اسپر ے کریں کہ تمام ہودے زہرے اچھی طرح تر ہو جا تیں۔

احتیا ہی بڑا ہیرے کے دوران ناک منداور آتھوں کی جناظت کریں اورز ہر کو کیڑوں پرنڈ کرنے دیں کیؤنگڈز ہر جلد کے ذریعے جذب ہوسکتا ہے۔ امیرے کے دوران کھانے بینے اورتہا کوؤنٹی ہے پر ہیز لریں۔ امیرے کرتے وقت ہوا کے نالف در ٹی ہر امیرے ندکریں۔ کلول بناتے وقت وستانے ، مفاطق چشہ اور ماسک پیٹیں ۔ زبرے خالی پیک کواستعمال بین مالا کیں بلکہ نا قابل استعمال بنا کریائی کے ذخیروں ہے دورزیین میں گہرادفن کریں۔اسپرے ہے فارغ ہوکر پورےجم اور کیٹر دن کواچھی طرح صابن اورصاف یا ٹی ہے دعولیس۔

ملی امداد: زېر کے غاداستعمال پاپ احتیالی کے باعث حادثے کی صورت میں مریض کو کھی سایہ دار جگہ برلٹا تھیں۔ اس کاجھم گرم رکھی اورز ہر آلود کیڑے ساتار دیں جم کے متاثر وصے کو صابن اورصاف پانی ے وحویس ۔ اگر ز براتھوں میں یا جائے تو 15 منٹ تک وافر صاف یانی ہے وحویس نے بر تکلئے کی صورت میں خود تے مت کروائی اور نہ ہی کوئی بائع یا کیں بلکہ فورا واکٹر کو بلائیں اور ز ہر کی خالی بلیگ

اشتراک: این زبرکو پیشتر زرمی ادویات کے ساتھ ملا کراسپر ہے کر بچتے ہیں ، بشرطیکدان میں انتھی شامل نہ ہو۔ تریاق: اس زبرکا کوئی خصوص تریاق نبیس لبذاذ اکم حضرات علامات کے مطابق علاج کریں۔

اختاه: استعال عقل گیمل پردرج بدایات فورے پڑھیں اورا سپرے ہدایات کے مطابق کریں، زرقی ادویات کو بچیں، فیمرڈ مددارافراد، پانو جانوروں اور کھانے پینے کی اشیاء ے دور منقفل رکھیں۔ سٹوریج زیر کومقر رومعیا داستعمال تک اسٹور کیا جاسکتا ہے بشر طبیکہ زیر کواس کی اصل پیکٹک میں سورج کی روشی ،اگری اورنی ہے دورہوا دارجگہ پر رکھا جائے۔

گارٹی نیز برلیمل پرورج خصوصیات کے مطابق ہاور محوز واستعمال کے لئے موز وں ہے۔ چونکدز ہر کا استعمال ہمارے دائر واقتیار ہے باہر ہے اس لئے ہم صرف اس کے معیاری ہونے کی مضائت دے كتيتين بابم خلططريق ير كف استعال كرن كاصورت بن اقتصان كى ذمدوارى تياركندگان التيم كندگان بر بركزنه بوكى -

Pre-Harvest Interval: (Interval between last application Harvesting) 21 Days

## www.fcgroup.com.pk

Distributed by:

## FC Agro Industries Pvt. Ltd.

Suraj Kund Road Rangeel Pur Multan UAN-0304-1112240 www.fcgroup.com.pk Factory: 13-KM, Kabirwala Road Mukhdoom pur.

